

## CIRCONCISIONE - Note esplicative ad uso dei genitori

### - Prima della procedura:

- Prima della procedura il mohel visiterà il neonato per verificare le condizioni di salute permettenti l'intervento, informerà entrambi i genitori delle modalità della circoncisione e richiederà il consenso informato dei genitori
- Il mohel richiederà che il pediatra del neonato sia stato informato della prossima circoncisione e abbia dato il suo consenso
- Il mohel informerà la comunità di appartenenza della famiglia del neonato dell'incarico ricevuto.

### - Durante la procedura:

- Il mohel attuerà tutte le precauzioni e le norme al fine di garantire la sicurezza per il neonato (asepsi, controllo sanguinamento ecc.) utilizzando strumenti sterili monouso.
- ***Metzitzà: la suzione diretta è vietata; è eventualmente consentita la suzione mediante strumento monouso sterile.***

### - Dopo la procedura:

- Il mohel garantirà la reperibilità sua o di un suo assistente nelle 24 ore successive.
- Seguire il bimbo fino a cicatrizzazione avvenuta e completa guarigione.
- Tenere un registro delle circoncisioni (accessibile per controllo) con schede che attestino il consenso ricevuto e il rispetto di tutte le norme e condizioni igienico sanitarie ed eventuali complicanze.
- A guarigione avvenuta deve essere inviato alla Comunità di appartenenza il certificato di avvenuta circoncisione.

Il vostro bimbo sarà circonciso, atto che consiste nella recisione del prepuzio che circonda l'estremità del pene. Il metodo applicato prevede l'uso di un MAGHEN (scudo protettivo) è **vero????** che assicura l'integrità del pene. Il prepuzio è asportato con l'aiuto di un bisturi sterile. Una fasciatura viene applicata intorno al pene. Questo intervento richiede pochi minuti e, normalmente, è semplice e non presenta complicazioni. In alcuni casi (dall'1% al 2% circa) si può presentare un sanguinamento eccessivo (emorragia) sia al momento della circoncisione che nelle

ore seguenti. Si arresta generalmente rifacendo la fasciatura; si può scoprire la fasciatura per esaminare il bimbo a più riprese nelle ore successive. Il mohel lo esaminerà prima di andare via. La probabilità di infezioni a seguito della circoncisione è molto bassa. Subito dopo la circoncisione è opportuno mettere, per 24 ore, al bimbo due pannolini, uno sull'altro, che gli forniranno una imbottitura supplementare e che vi permetterà di prenderlo in braccio e coccolarlo normalmente senza tema di fargli male.

Quando vi restituiscono il bimbo coccolatelo e nutritelo.

Mezz'ora dopo la circoncisione, il mohel esaminerà il bimbo e vi darà dettagliate istruzioni su come cambiare il pannolino, curare la ferita e occuparvi di lui. Vi mostrerà esattamente come dovete fare. Riceverete anche, prima della sua partenza, istruzioni dettagliate sul come proseguire le cure e come contattarlo in caso di domande, dubbi o inquietudini.

## CONSIGLI PRATICI POST-CIRCONCISIONE PER I GENITORI

1. mettere due pannolini per le prime 24 ore
2. prima di ogni cambio:
  - allattare /biberon
  - fargli fare il ruttino tenendolo in braccio
  - preparare garza e polvere cicatrizzante per il cambio
3. al cambio: essere accompagnati da un adulto che tenga le gambe del bimbo
4. dopo il cambio rimettere 2 pannolini e rivestire

### ATTENZIONE:

non mettere il bimbo a pancia in giù per vestirlo, addormentarlo e neanche metterlo a dormire sulle vostre ginocchia né metterlo in piedi sulle vostre cosce perché queste manovre potrebbero provocare un sanguinamento.